

La cigüeña blanca en palencia.

Población reproductora e invernante 2009

INTRODUCCIÓN

La cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*) es un ave zancuda de gran tamaño, con unos 100-110 cm de altura y 195-215 cm de envergadura, ligeramente mayor los machos que las hembras. Como el resto de las zancudas posee cuello, patas y pico largos. El plumaje en ambos sexos es blanco, contrastando fuertemente con el negro de las alas. El pico y las patas son de un rojo intenso, salvo en los pollos y jóvenes cuando el pico es negro, tornando a pardo antes de adquirir el aspecto de adulto al año de nacimiento.

El último censo de la población reproductora en España se realizó en 2004, durante el VI Censo Internacional de cigüeña blanca, registrándose un total de 33.217 parejas reproductoras, record histórico que confirma la tendencia al alza que viene produciéndose desde el año 1984.

LA CIGÜEÑA EN PALENCIA

La cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*) es una de las aves mejor conocidas de la provincia de Palencia.

Población reproductora:

Su población ha sido censada en dieciocho ocasiones, iniciándose este estudio en 1948, lo que está permitiendo cuantificar objetivamente la evolución de las poblaciones de esta especie, así como los efectos de las diferentes políticas de aplicación territorial y las amenazas que se ciernen sobre sus poblaciones.

La población palentina ha seguido una evolución paralela al del resto de las poblaciones ibéricas, recuperándose espectacularmente después de haber atravesado una situación crítica en la década de los 80 del siglo XX, alcanzando en la actualidad una población de 984 parejas reproductoras, lo que representa una densidad poblacional de 12,25 parejas/100 km², la más alta conocida hasta la fecha para la provincia de Palencia. Este incremento no se ha producido por igual en todos los rincones de la provincia, siendo mayor en las comarcas de Tierra de Campos, Riberas del Carrión, Páramo de La Cueva, Carrión y Montaña Palentina (Fuentes Carriona, La Pernía y Campoo), prosiguiendo su reducida presencia en amplias zonas de la Valdivia, El Boedo, La Ojeda, las Lomas de Ucieza o el Cerrato.




Gráfico. Evolución de la población de parejas reproductoras en la provincia de Palencia (1948-2009)

Los nidos se localizan preferentemente en construcciones humanas, seguido de árboles y otros soportes.




Gráfico. Sustratos de emplazamiento de nidos en la provincia de Palencia

Los parámetros reproductores obtenidos en este censo han sido los más bajos conocidos para la provincia:

- Productividad real (número de pollos por número de parejas con algún pollo): 0,92 pollos/pareja
- Productividad total (Número de pollos por pareja de las que se conoce el resultado de la cría): 1,84 pollos/pareja
- Éxito reproductor: 50,00%
- Número de pollos volados en 2009: 834 de los 944 nidos en los que se ha podido ver el contenido.

Estos parámetros reproductores varían sustancialmente entre las diferentes comarcas palentinas, siendo inferiores a los valores medios históricos en prácticamente la totalidad de la provincia, destacando negativamente la comarca de Campoo, una de las de mayor densidad poblacional de cigüeña.

Unidad Territorial	Nº parejas	Densidad poblacional (Std)	Éxito reproductor	Nº pollos	Productividad total (JZa)	Productividad real (JZm)
Boedo	2	3,57	1,00	3	1,50	1,50
Campoo	109	38,71	0,09	4	0,04	0,40
Carrión	109	26,09	0,35	57	0,54	1,58
El Cerrato	3	1,24	0,67	2	0,67	1,00
Fuentes Carriona	4	1,91	0,75	4	1,00	1,33
La Lora	4	6,25	0,25	1	0,25	1,00
La Ojeda	6	4,19	0,33	4	0,67	2,00
La Pernía	81	12,82	0,43	67	0,83	1,91
La Valdavia	49	8,06	0,55	40	0,85	1,54
Lomas de Ucieza	41	10,43	0,59	37	0,95	1,61
Montes Torozos	6	5,39	0,17	1	0,17	1,00
Páramo de Astudillo	39	17,70	0,72	48	1,23	1,71
Páramo de La Cueva	111	25,35	0,59	109	1,04	1,76
Ribera del Arlanza	6	7,95	0,50	5	0,83	1,67
Ribera del Arlanzón	1	11,11	1,00	2	2,00	2,00
Ribera del Carrión	239	38,05	0,65	285	1,43	2,11
Ribera del Pisuerga	51	7,69	0,53	46	0,90	1,70
Tierra de Campos	123	16,22	0,57	107	1,13	1,91
General	984	12,25	0,50	834	0,92	1,84

Tabla. Parámetros reproductores y densidad por unidades territoriales

Población invernante:

Tradicionalmente durante agosto y septiembre cruzaba el estrecho de Gibraltar en su migración postnupcial, desapareciendo de la Península Ibérica durante los meses de octubre y noviembre, y retornando a sus áreas de cría a lo largo del mes de diciembre y enero, siendo este último el mes típico de llegada para la provincia de Palencia.

A partir de los años 80 del siglo XX se ha producido un cambio en la conducta migratoria de la cigüeña blanca en una parte de sus poblaciones, invernando en la Península Ibérica una fracción de la población, principalmente en el suroeste peninsular.

En la provincia de Palencia se han censado durante la presente invernada un total de 484 cigüeñas blancas, el mayor número contabilizado hasta la fecha.

Localidad	Fecha	Ubicación	Método	Nº
Mazariegos	29/10/2009	Nido	Dormidero	6
Palencia	29/10/2009	Urbano	Dormidero	236
Fuentes de Nava (La Nava)	29/10/2009	Zona húmeda	Dormidero	207
Becerril de Campos	02/11/2009	Nido	Dormidero	22
Paredes de Nava	02/11/2009	Nido	Dormidero	1
Carrión de los Condes	02/11/2009	Nido	Dormidero	2
Calzada de los Molinos (Gravera de Tomillares)	02/11/2009	Zona húmeda	Dormidero	6
Frómista	03/11/2009	Nido	Dormidero	2
Amusco	03/11/2009	Nido	Dormidero	2
Total				484

Tabla. Localidades con censo positivo de cigüeñas invernantes

Información obtenida de: *González-Villalba, C.; F. Jubete; C. Zumalacárregui; A. Rodríguez; A. Herrero y A. Bello. 2009. Censo de parejas reproductoras y población invernante de cigüeña blanca (Ciconia ciconia) en la provincia de Palencia. Año 2009. Fundación Global Nature. Informe inédito, disponible en www.ciguenablanca.org*